

Benzylbenzoat

Der Ester Benzylbenzoat ist ovozid und akarizid gut wirksam. Bei Erwachsenen und Jugendlichen ab dem Alter von 12 Jahren wird eine 25%ige, bei Kindern unter 12 Jahren eine 10%ige Emulsion angewendet. Dabei sollte Benzylbenzoat im Zeitraum von 3 aufeinanderfolgenden Tagen aufgetragen werden und erst am 4. Tag abge-

spült werden. Häufige lokale Nebenwirkungen sind Hautreizungen und allergische Kontaktekzeme, die Substanz sollte ausserdem nicht mit Schleimhäuten in Kontakt kommen. Bei Schwangerschaft und Stillzeit ist eine Anwendung nur bei zwingender Indikation empfohlen, im 1. Lebensjahr ist Benzylbenzoat kontraindiziert.

Crotamiton

Crotamiton, dessen Wirkmechanismus noch nicht vollständig geklärt ist, wird an 3–5 Tagen in Folge aufgetragen und erst nach Therapieende abgespült. Unerwünschte Wirkungen umfassen irritative Hautreaktionen und Juckreiz, der Kontakt mit Schleimhäuten ist zu vermeiden. Im Gegensatz zu Permethrin und Benzylbenzoat gibt es keine Altersbeschränkung für die Anwendung. Obwohl Crotamiton bei Schwangerschaft und Stillzeit nicht kontraindiziert ist, sollte dennoch eine gründliche Nutzen-Risiko-Abwägung vorgenommen werden.

Ivermectin

Ivermectin